




## آموزش بیماران آنچه نیاز دارید در مورد اتوپساید بدانید؟



فریبا کاظمی اسکندانی

سرپرستار بخش خون و انکولوژی ۲

مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم  
پزشکی تبریز- پاییز ۱۳۸۷

بپرهیزید. مراقب دندان هایتان باشید و سعی کنید حین مسواک زدن به لثه و دندانتان آسیب نرسد.

در زمان دریافت اتوپساید، خطر عفونت افزایش می یابد. از افرادی که سرما خوردگی، آنفلوانزا یا برونشیت دارند، دوری کنید.

بدون تجویز پزشک واکسن تزریق نکنید. از افرادی که واکسن فلج اطفال دریافت کرده اند، دوری کنید.

در صورت بروز تب، لرز، سرفه، زخم گلو و دیگر نشانه های سرماخوردگی به پزشک اطلاع دهید. هرگز خوددرمانی نکنید.

منبع مورد استفاده:

<http://www.drugdigest.org>

• خستگی و ضعف غیر عادی

• استفراغ

**عوارض جانبی که نیاز به توجه خاص پزشکی ندارند و فقط در صورت ادامه، پزشک را مطلع کنید:**

• اسهال

• ریزش مو

• سردرد

• کاهش اشتها

• تهوع

**چه اقداماتی را باید حین دریافت دارو انجام دهید؟**

شما باید برای کنترل سیر بیماری و انجام منظم آزمایشات خونی به پزشک مراجعه کنید.

ممکن است حین دریافت دارو احساس ناخوشایندی داشته باشید، چون دارو روی سلول های سالم همانند سلول های سرطانی اثر می کند. عوارض فوق را گزارش کنید و دریافت دارو را ادامه دهید و بدون دستور پزشک قطع نکنید.

اتوپساید ممکن است اختلالات خونی را سبب شود. ممکن است خطر عفونت افزایش یابد. از آسیب به خود

## اتوپساید چیست؟

اتوپساید داروی شیمی درمانی است که برای درمان انواع سرطان ها استفاده می شود. اتوپساید در درمان سرطان های ریه و بیضه مؤثر است. اتوپساید تقسیم سریع سلول های سرطانی را مهار نموده و موجب مرگ سلولی می شود.

## حین دریافت دارو چه موادی را باید به تیم بهداشتی اطلاع دهید؟

لازم است تا اعضای تیم بهداشتی از موارد زیر اطلاع داشته باشند:

- اختلالات خونریزی دهنده
- بیماری های خونی
- تزریق داخل عضلانی
- عفونت (باکتریال، ویروسی و قارچی)
- هرگونه واکنش حساسیتی به داروهای شیمی درمانی، غذاها
- حاملگی یا تصمیم به حامله شدن
- شیر دهی

## چگونه باید این دارو را دریافت کنید؟

اتوپساید به صورت انفوزیون داخل وریدی تجویز می شود. دارو در بیمارستان یا درمانگاه توسط افراد آموزش دیده و متخصص تزریق می شود.

## چه داروهایی با اتوپساید تداخل می کنند؟

- سیس پلاتین
- سیکلوسپورین
- سیتوزار
- ایفوسفامید
- واکسن ویروس زنده
- متوتروکسات
- وراپامیل
- در مورد داروهایی که استفاده می کنید بویژه داروهایی که خودسرانه مصرف می کنید و غذاها ، با تیم بهداشتی صحبت کنید. چنانچه سیگاری یا الکلی هستید و یا کافئین زیاد مصرف می کنید به تیم بهداشتی اطلاع دهید. این داروها ممکن است

در عملکرد دارو اثر کنند. قبل از شروع یا قطع آن ها با پزشک مشورت کنید.

## عوارض جانبی که باید حین دریافت اتوپساید به آن توجه کنید؟

عوارضی که باید در صورت بروز هر چه سریعتر به پزشک اطلاع دهید، عبارتند از:

- مدفوع قیری و سیاه رنگ
- خون در ادرار
- تنفس مشکل و خس خس سینه
- ضربانات سریع قلب
- سنکوپ و سبکی سر
- تب و لرز ، سرفه یا زخم گلو
- درد پشت
- زخم دهان
- درد و سوزش ادرار
- درد ، قرمزی، تورم و تحریک محل تزریق
- خونریزی غیر عادی یا جوش های ریز قرمز روی پوست، خونریزی از بینی