



آموزش بیماران آنچه نیاز دارید در مورد آدریامایسین بدانید؟



فریبا کاظمی اسکندانی

سرپرستار بخش خون و انکولوژی ۲

مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم
پزشکی تبریز- پاییز ۱۳۸۷

⊗ حین دریافت دارو ممکن است توانایی بدن برای مقابله با عفونت کاهش یابد. در صورت تب، لرز، سرفه، زخم گلو و سایر نشانه های سرماخوردگی به پزشک اطلاع دهید.
⊗ هرگز خوددرمانی نکنید. از افراد بیمار دوری کنید. جوش های ته سنجاقی قرمز، کوفتگی، مدفوع قیری، خون در ادرار را به پزشک اطلاع دهید. در صورت خونریزی غیر عادی به پزشک اطلاع دهید و مراقب باشید تا آسیب نبینید.
⊗ از مصرف آسپرین - استامینوفن - ایبوپروفن - ناپروکسن یا هر دارویی که تب را مخفی می کند، پرهیز کنید.
⊗ در صورت اسهال به پزشک خبر دهید و خودسرانه درمان نکنید.
⊗ در صورت جراحی، به پزشک مصرف دارو را اطلاع دهید.

⊗ با احتیاط مسواک بزنید. در صورت مراجعه به دندانپزشک مصرف دارو را اطلاع دهید.

منبع مورد استفاده:

<http://www.drugdigest.org>

عوارضی که باید در صورت بروز هر چه سریعتر به پزشک اطلاع دهید، عبارتند از:

- اسهال
- برافروختگی صورت
- ریزش مو
- سوزش سردل
- قرمز شدن رنگ ادرار (۲-۱ روز بعد از درمان بروز می کند).
- قرمزی چشم

چه اقداماتی را باید حین دریافت دارو انجام دهید؟

⊗ باید برای کنترل سیر بیماری و انجام منظم آزمایشات خونی به پزشک مراجعه کنید. بعد از درمان، ادرار ممکن است قرمز رنگ شود. که با وجود خون در ادرار متفاوت است و پس از چند روز بدون درمان، برطرف می شود.

⊗ ممکن است حین دریافت دارو، احساس ناخوشایند داشته باشید، چون دارو بر روی سلول های سالم همانند سلول های سرطانی اثر می کند. عوارض فوق را گزارش کنید.

آدریامایسین چیست؟

آدریامایسین داروی شیمی درمانی است که برای درمان انواع سرطان ها از جمله سرطان های استخوان، پستان، معده، ریه، مثانه، تیروئید، تخمدان و لوسمی استفاده می شود. آدریامایسین تقسیم سریع سلول های سرطانی را مهار نموده موجب مرگ سلولی می شود. آدریامایسین به تنهایی یا به همراه سایر داروهای شیمی درمانی و رادیوتراپی به کار می رود.

حین دریافت دارو چه موادی را باید به تیم بهداشتی اطلاع دهید؟

لازم است تا اعضا تیم بهداشتی موارد زیر را بدانند:

- آنژین، بیماری قلبی
- اختلالات خونریزی دهنده
- فشارخون بالا
- عفونت (باکتریال، ویروسی، قارچی)
- سابقه شیمی درمانی با سرویدین، اپی رویسین، ایدارویسین یا میتوکسائترون
- هرگونه واکنش حساسیتی به آدریامایسین، داروهای شیمی درمانی، غذاها
- حاملگی یا تصمیم به حامله شدن و شیردهی

چگونه باید این دارو را دریافت کنید؟

آدریامایسین به صورت انفوزیون داخل وریدی تجویز می شود. دارو در بیمارستان یا درمانگاه توسط افراد آموزش دیده و متخصص تزریق می شود. شما باید برنامه درمانی را به طور منظم ادامه دهید. در صورت درد، تورم، سوزش محل تزریق بلافاصله اطلاع دهید. بین دوز دارو ممکن است چندین هفته فاصله باشد.

چه داروهایی با آدریامایسین تداخل می کنند؟

در مورد داروهایی که اثرات آدریامایسین را افزایش می دهند از پزشک سؤال کنید.

- آنتی بیوتیک های خاص (مانند اریترومایسین،)
- سیزاپراید
- کلروکین
- دروپریدول
- لوومتادیل
- داروهای که برای کنترل آریتمی قلبی داده می شود. (آمینودارون، بپردیل، پروکائین آمید، کینیدین)
- داروهایی که برای اختلالات روانی، جنون و افسردگی بکار می روند (آمی تریپتیلین،

کلرپرومازین، فلوفازین، هالوپریدول، پرفنازین و تیوریدازین).

- سایر داروهای شیمی درمانی
- فنوباریتال
- واکسن ها

قبل از مصرف داروهای زیر با پزشک صحبت کنید:

- آسپرین - استامینوفن - ایوپروفن - ناپروکسن و کتوپروفن

در مورد داروهایی که استفاده می کنید بویژه داروهایی که خود سرانه مصرف می کنید و غذاها، با تیم بهداشتی صحبت کنید. چنانچه سیگاری یا الکی هستید و یا کافئین زیاد مصرف می کنید به تیم بهداشتی اطلاع دهید. این داروها ممکن است در عملکرد دارو اثر کنند. قبل از شروع یا قطع آنها با پزشک مشورت کنید

عوارض جانبی که باید حین دریافت آدریامایسین به

آن توجه کنید؟

عوارض جانبی ناشی از آدریامایسین بستگی به دوز دارو، روش تزریق و رادیوتراپی اخیر، سایر داروهای شیمی درمانی و بیماری زمینه ای دارد. عوارض دارویی در تمام بیماران بروز نمی کند.