



آموزش بیماران

آپه نیاز دارید در مورد سرویدین

براندید؟



مهری گلچین

سوپروایزر آموزشی

مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم

پزشکی تبریز

بهار ۱۳۸۷

بریدگی، کبودی و یا ایجاد صدمه خودداری

نمایید. از مصرف آسپیرین ، استامینوفن، ایبوپروفن ، ناپروکسن و کتوپروفن خودداری نمایید زیرا این داروها تب را مخفی می نمایند(مگر این که توسط پزشک تجویز گردد).

وجود اسهال را به کادر درمانی و یا پزشک اطلاع داده و اقدام به خود درمانی ننمایید زیرا اغلب داروهای ضد اسهال، اسهال را بدتر می نمایند.

در صورت استفاده از سرویدین، هنگام مسواک زدن ، استفاده از نخ دندان و یا خلال دندان مراقب باشید زیرا ممکن است راحتی دچار خونریزی شده و یا دچار عفونت گردید. در صورت هرگونه اعمال دندان پزشکی ، مصرف این دارو را به پزشک متذکر شوید. مردان و زنان در سنین باروری بایستی در طی مصرف این دارو، از روش های پیشگیری از بارداری مناسب استفاده نمایند زیرا خطر بروز نقایص جنینی در زنان دریافت کننده این دارو وجود دارد. زنان در طی دریافت این دارو و یا در صورتی که همسر وی سرویدین دریافت می نماید، بایستی باردار شوند.

۷. کجا بایستی این دارو را دریافت

نمایم؟

این دارو در مطب پزشکام و یا در بیمارستان تزریق می گردد و نمی توانید در منزل اقدام به دریافت دارو نمایید. منبع مورد استفاده:

<http://www.drugdigest.org>

❖ قرمزی رنگ ادرار (ممکن است ۲-۱ روز بعد از قطع درمان ظاهر شود)

۶. هنگام دریافت سرویدین چه مواردی

را بایستی کنترل نمایم؟

بصورت منظم و دوره ای به پزشک برای بررسی پیشرفت بهبودی بیماری مراجعه نمایید. بایستی آزمایشات منظم خون انجام دهید. بعد از درمان با سرویدین، ممکن است رنگ ادرار قرمز گردد. این قرمزی به علت وجود خون در ادرار نمی باشد و در عرض چند روز از بین می رود. در صورتی که به وجود خون در مدفوع مشکوک هستید به پزشک مراجعه نمایید. در صورت مصرف این دارو، ممکن است احساس کنید که حال عمومی خوبی ندارید زیرا سرویدین علاوه بر سلول های سرطانی، سلول های سالم بدن را نیز متاثر می نماید. بروز هرکدام از عوارض جانبی بیان شده را گزارش نمایید ولی **بایستی دوره درمان را کامل نمایید مگر این که پزشک اقدام به قطع دارو نماید.**

این دارو ممکن است توانایی بدن را در مقابله با عفونت کاهش دهد. وجود تب، لرز، زخم گلو یا سایر علائم و نشانه های سرماخوردگی و آنفلونزا را به پزشک اطلاع دهید و **اقدام به خود درمانی ننمایید.** در صورت مصرف این دارو ممکن است خطر کبودی یا خونریزی افزایش یابد. وجود هرگونه خونریزی غیر طبیعی را اطلاع دهید. **از هرگونه**

مقدمه: این کتابچه حاوی اطلاعات مفیدی در مورد **سرویدین** است که می تواند برای شما مفید باشد. این کتابچه را همیشه دم دست داشته باشید تا در موارد لزوم به آن مراجعه نمایید.

۱. سرویدین چیست؟

نام دیگر آن دائونوروبیسین می باشد. نوعی شیمی درمانی سرطان هست که برای درمان لوسمی حاد بکار می رود. این دارو با رشد سلول های سرطانی ممانعت نموده و نهایتا موجب مرگ سلولی می گردد. معمولا همراه با سایر داروهای شیمی درمانی بکار می رود.

۲. قبل از استفاده از سرویدین باید چه چیزهایی را مد نظر قرار دهید؟

وجود هر کدام از موارد زیر را اطلاع دهید:

- عفونت فعال
- سابقه قلبی واکنش های آلرژیک (حساسیت) به این دارو و یا سایر داروهای شیمی درمانی، سایر داروها، غذاها و...
- ناراحتی های قلبی، فشارخون
- اختلالات خونی، مشکلات خونریزی
- بیماری های کبدی، بیماری های کلیوی
- سابقه رادیوتراپی
- سابقه شیمی درمانی با آدریامایسین، اپی - روبیسین، میتوکسانترون و یا ایداروبیسین
- بارداری و دوران شیردهی

۳. سرویدین چگونه تجویز می گردد؟

این دارو توسط پرسنل آموزش دیده و در بیمارستان و یا مطب پزشکان بصورت تزریق داخل وریدی مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت وجود درد، تورم و احساس سوزش محل تزریق بلافاصله به کادر درمانی اطلاع دهید.

۴. تداخلات دارویی

داروهایی که موجب افزایش تاثیر دارو می گردند: برخی آنتی بیوتیک ها (اریترومایسین)، سیزاپراید، کلروکین، داروهای مورد استفاده برای کنترل ریتم قلبی (آمیودارون، پروکائین آمید، کینیدین و...)، داروهای مورد استفاده برای مشکلات ذهنی، سایکوز یا افسردگی (آمی تریپتیلین، کلرپرومازین، فلوئنازین، هالوپریدول، پرفنازین)، متادون و واکسن ها

مصرف هر کدام از داروهای زیر را اطلاع دهید: آسپیرین، استامینوفن، ایبوپروفن، کتوپروفن و ناپروکسن

۵. عوارض جانبی:

این دارو همانند سایر داروهای ضد سرطان، عوارض جانبی ناخواسته ای دارد. این عوارض بستگی به دوز دارویی، سایر داروهای شیمی درمانی و رادیوتراپی انجام شده و نوع بیماری بستگی دارد. در تمام بیماران این عوارض همگی رخ نمی دهند. در مورد خطرات و فواید درمان، از پزشک سوال نمایید. بایستی برخی از این عوارض جانبی ناخواسته **بلافاصله** درمان گردند.

عوارض جانبی نادر یا ناشایع:

درد قفسه سینه، تنفس مشکل، خس خس سینه، ضربان قلب نامنظم، تورم میچ پا یا پاها

عوارض جانبی شایع:

- * شمارش پایین سلول های خونی که در این صورت فرد مستعد ابتلا به عفونت یا خونریزی می گردد.
- * **علائم عفونت:** شامل تب و لرز، سرفه، زخم گلو، درد و یا ناراحتی در هنگام ادرار کردن
- * **علائم خونریزی:** کبودی، لکه های قرمز پوستی نوک سوزنی، مدفوع سیاه و قیری، وجود خون در ادرار
- * **علائم کم خونی:** شامل ضعف و خستگی بیش از حد، حملات غش، احساس سبکی سر، ریتم قلبی نامنظم، تپش قلب، درد سینه، زخم گلو و دهان
- * درد، قرمزی و تورم یا التهاب محل تزریق
- * راش پوستی، خارش و پوسته ریزی

عوارض جانبی که معمولا نیازمند توجهات پزشکی نیستند:

(در صورت تداوم عوارض و یا ایجاد ناراحتی به پزشک و

یا کادر درمانی مراجعه نمایید)

- ❖ اسهال
- ❖ ریزش مو
- ❖ سوزش قلب
- ❖ کاهش اشتها
- ❖ تهوع