



۲۵ درجه سانتی گراد قرار داده نشود. از نور آفتاب محافظت گردد.

بایستی محلول بعد از آماده سازی، در دمای اتاق بمدت ۸ ساعت و در دمای یخچال بمدت ۲۴ ساعت مورد استفاده قرار گیرد.

**Reference: Brochure ,Bristol-Myers Squibb.**

## آموزش بیماران

آنچه نیاز دارید در

مورد **"Fungizone"**

آمفوتریسین " بدانید؟"



مهری گلچین

سوپروایزر آموزشی

مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم

پزشکی تبریز

بهار ۱۳۸۷

▪ برخی بیماران دچار سردرد، کاهش وزن کاهش اشتها، سوء هضم، تهوع، درد معده، اسهال و استفراغ، ضربان قلب نامنظم، درد مفاصل و عضلات، درد محل تزریق و التهاب ورید ها می گردند. بصورت ناشایع بیماران ممکن است دچار شنیدن صدای زنگ در گوش یا کاهش شنوایی، تاری دید و یا دوبینی، احساس گیجی، تعریق، ضعف، سرگیجه گذرا، اشکال در دفع ادرار، وجود خون در مدفوع، بیحسی انگشتان، گزگز دست ها و پاها و فلاشینگ صورت گردند. اختلالات خونی نیز بصورت تب یا لرز، زخم های گلو و دهان، خستگی و ضعف شدید، خونریزی غیر عادی و کبودی غیر منتظره مشاهده می شود. در صورت وجود هرکدام از این علائم و نشانه ها، بلافاصله آنها را به پزشک اطلاع دهید.

### ۵. نحوه نگهداری:

تاریخ انقضا: نباید بعد از انقضای تاریخ مصرف، دارو مورد استفاده قرار گیرد.

احتیاطات خاص نگهداری: دارو دور از دسترس کودکان قرار گیرد. در دمای بالاتر از

**مقدمه:** این پمفلت حاوی اطلاعات مفیدی در مورد **Fungizone** است که می تواند برای شما مفید باشد. این کتابچه را همیشه دم دست داشته باشید تا در موارد لزوم به آن مراجعه نمایید.

## ۱. Fungizone چیست و در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد؟

عناصر فعال در **Fungizone** حاوی آمفوتریسین می باشد که به صورت ویال ۵۰ میلی گرم ( 50000 IU ) جهت تزریق وریدی می باشد. این دارو جزء دسته ای از داروها تحت عنوان آنتی بیوتیک های ضد قارچ می باشد.

**۲. چرا Fungizone تجویز شده است؟**  
معمولا این دارو برای درمان عفونت های شدید ناشی از مخمر ها و قارچ ها بکار می رود.

## ۳. مواردی که Fungizone نبایستی استفاده گردد؟

در موارد زیر نبایستی از این دارو استفاده گردد:

- سابقه قبلی واکنش های آلرژیک (حساسیت) شدید به این دارو

- وجود هر گونه بیماری کبدی و عدم کارکرد صحیح کلیوی

## ۴. در صورت بارداری و یا تمایل به حاملگی آیا می توان از این دارو استفاده نمود؟

بایستی با پزشک خود صحبت نمایید.

## ۵. آیا می توانم داروهای دیگری هم دریافت نمایم؟

مصرف سایر دارو ها را حتما به پزشک اطلاع دهید. این داروها شامل شل کننده های عضلانی ، داروهای ضد سرطان، دیگوکسین، استروئید ها و سایر داروهای بدون نسخه که توسط بیمار مصرف می شود، می باشد.

## ۶. دوز مصرفی دارو چیست و چه موقع داده می شود؟

دوز روزانه مصرفی ۱- ۰/۲۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد. بایستی دارو در ابتدا آرام و بصورت تزریق وریدی و در عرض چند ساعت تزریق گردد. قبل از شروع درمان "تست دارو" انجام می گیرد. برای برطرف

شدن کامل عفونت، دارو بمدت چندین ماه تجویز می گردد.

## ۷. آیا نیاز هست تا داروهای دیگری را به همراه این دارو مصرف نمایم؟

در اغلب موارد، پزشک داروهای ضد تهوع و استفراغ یا اسپیرین، آنتی هیستامین، استروئید یا داروی ضد انعقاد برای کمک به رفع عوارض جانبی ناشی از درمان تجویز می نماید.

## عوارض جانبی ناخواسته دارو چیست ؟

این دارو بر سلول های خونی، کلیه ها، کبد یا قلب تاثیر می گذارد. به این دلیل، پزشک قبل، حین و بعد درمان آزمایشات و تست های تشخیصی مربوطه را انجام خواهد داد. در تعداد کمی از بیماران، این دارو ممکن است موجب بروز واکنش های حساسیتی با افزایش درجه حرارت بدن ، لرز، تشنج، بشورات پوستی و یا خارش گردد. چون این واکنش های حساسیتی در اغلب موارد در طی دقایق اولیه تزریق دارو، رخ می دهد لذا بایستی بیمار تحت توجهات دقیق پزشکی قرار داشته باشد.