



آموزش بیماران

آنچه نیاز دارید در مورد تاکسوتر

برانید؟



مهری گلچین

سوپروایزر آموزشی

مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم

پزشکی تبریز

بهار ۱۳۸۷

- کاهش فشار خون و افزایش ضربان قلب
 - وجود درد ، واکنش های پوستی ، فلبیت و تورم محل های تزریق
 - احساس خستگی شدید
- شما ممکن است یک یا تعدادی از این نشانه ها را تجربه کنید. در طی دوره های تزریق ، در صورت وجود نشانه هایی همانند درد شکمی زودرس، حساسیت شکم، تب یا اسهال بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید.
- در صورت بروز سایر نشانه های بیماری، آنها را با پزشک مطرح نمایید.

۵. نحوه نگهداری تاکسوتر:

- ✱ **تاریخ انقضا** : نباید بعد از انقضای تاریخ مصرف ، دارو مورد استفاده قرار گیرد.
- ✱ **احتیاطات خاص نگهداری**: دارو دور از دسترس کودکان قرار گیرد. ویال های تاکسوتر در دمای بین ۲ و ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شده و از نور آفتاب محافظت گردند. بایستی تاکسوتر مخلوط شده با حلال، بلافاصله بعد از آماده سازی مورد استفاده قرار گیرد. در عین حال مطرح شده است که پایداری فیزیکی و شیمیایی محلول در دمای اتاق و یا دمای یخچال (۲ تا ۸ درجه سانتی گراد) حفظ می گردد.
- محلول آماده شده برای تزریق بایستی در دمای اتاق و در عرض ۴ ساعت تزریق گردد.

Reference: Brochure Taxotere, Aventis.

- واکنش های آلرژیک که بصورت بروز یک و یا چند تا از علائم زیر مشخص می شود:
برافروختگی صورت، واکنش های پوستی، خارش، احساس فشار در قفس سینه، درد پشت، ناراحتی تنفسی، تب یا لرز.
- ✱ **در بین فواصل زمانی تزریق تاکسوتر ممکن است موارد زیر رخ دهند:**

- کاهش در تعداد گلبول های قرمز یا سفید خون (گلبول های سفید در مقابله با عفونت نقش خیلی مهمی دارند)، پلاکت ها و افزایش آنزیم های کبدی (بنابر این آزمایشات خونی بایستی بصورت منظم انجام گیرد) .
- عفونت های راجعه شدید
- بروز تب . در صورت افزایش درجه حرارت بدن، بلافاصله به پزشک مراجعه گردد.
- تورم مکرر دست ها و پاها و یا افزایش وزن
- احساس بی حسی، فرو رفتن سوزن و یا درد در مفاصل یا عضلات ، احساس ضعف
- ناراحتی های شدید معده مانند تهوع و استفراغ
- زخم های دهانی و بی اشتها
- بیوست
- برافروختگی صورت، واکنش های پوستی، خارش، احساس فشار در قفسه سینه، درد پشت، ناراحتی تنفسی،
- ریزش موقتی مو که شایع است. بعد از اتمام درمان، موها مجددا رشد خواهند نمود.

مقدمه: این کتابچه حاوی اطلاعات مفیدی در مورد تاکسوتر بوده و می تواند برای شما مفید باشد. این کتابچه را همیشه دم دست داشته باشید تا در موارد لزوم به آن مراجعه نمایید.

۱. تاکسوتر چیست و در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد؟

نام دیگر این دارو که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد Docetaxel می باشد. این دارو جزء گروهی از داروهای ضد سرطان تحت عنوان taxoids می باشد. هر بسته این دارو حاوی یک ویال تاکسوتر و یک ویال حلال دارو می باشد. تاکسوتر ۲۰ و ۸۰ میلی گرمی بوده و بایستی تغلیظ و رقیق سازی دارو، قبل از تزریق انجام گیرد.

این دارو توسط پزشک معالج برای درمان سرطان پستان، اشکال خاص سرطان ریه، سرطان تخمدان یا سرطان پروستات تجویز می شود.

۲. قبل از استفاده از تاکسوتر باید چه چیزهایی را مد نظر قرار دهید؟

☆ در موارد زیر نبایستی از این دارو استفاده گردد:

- سابقه قبلی واکنش های آلرژیک (حساسیت) شدید به این دارو
- کاهش شدید تعداد گلبول های سفید خون
- وجود بیماری شدید کبدی
- بارداری و دوران شیردهی

☆ احتیاطات خاص دارو:

قبل از دریافت دارو، انجام آزمایشات خونی برای کنترل مناسب بودن گلبول های خونی و عملکرد طبیعی کبد الزامی است. ممکن است برای ایجاد آمادگی بهتر و کاهش اثرات ناخواسته دارویی (بصورت واکنش های حساسیتی و احتباس مایعات "تورم دست و پا و یا افزایش وزن")، کورتیکواستروئید خوراکی از قبیل دگزامتازون را، قبل از تجویز دارو یک عدد در روز و بعد از شروع درمان نیز بمدت ۲-۱ روز دیگر دریافت نمایید. در طی درمان، داروهایی برای رساندن سلول های خونی به حد طبیعی، تجویز می گردد.

☆ تداخلات دارویی:

توصیه می شود قبل از مشورت با پزشک، از هیچ دارویی استفاده نگردد زیرا ممکن است تداخلات دارویی بین تاکسوتر و سایر داروها انجام گیرد. هر گونه مصرف دارو را با پزشک در میان بگذارید.

☆ بارداری و شیر دهی:

در صورت بارداری و یا تمایل به بارداری، نباید این دارو تجویز گردد. بایستی در طی درمان از روش های مناسب پیشگیری از بارداری استفاده گردیده و نیز تا ۳ ماه بعد از دریافت تاکسوتر بایستی از بارداری خودداری گردد. در صورت بروز حاملگی، بلافاصله به پزشک اطلاع دهید. در دوران شیردهی نیز نبایستی از این دارو استفاده گردد.

☆ اثرات احتمالی دارو در هنگام رانندگی و کارهای

عملی:

در صورت عدم احساس گیجی، هیچ دلیل خاصی برای عدم انجام این اعمال وجود ندارد.

۳. تاکسوتر چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

☆ دوزاژ معمولی:

دوز مورد استفاده به وزن و وضعیت عمومی بدن بستگی دارد. پزشک بر اساس سطح بدن، دوز مورد نیاز را محاسبه می نماید.

☆ روش تجویز:

تاکسوتر از طریق تزریق وریدی تجویز می گردد. تزریق دارو در بیمارستان صورت گرفته و تقریباً یک ساعت طول می کشد.

☆ دفعات تکرار تزریق دارو:

معمولاً دارو هر ۳ هفته یک بار تزریق می گردد. ممکن است پزشک دوز و دفعات دریافت دارو را بر اساس نتایج آزمایشات خونی و وضعیت عمومی بدن و پاسخ شما به دارو، تغییر دهد. در صورت وجود هرگونه سوال، آن را با پزشک و یا پرستار در میان بگذارید.

۴. عوارض جانبی:

تاکسوتر همانند سایر داروهای ضد سرطان، عوارض جانبی ناخواسته ای دارد. در مورد خطرات و فواید درمان از پزشک سوال نمایید.

ممکن است در طی تزریق دارو موارد زیر رخ دهد: