



آموزش بیماران

آپنه نیاز دارید در مورد CAMPTO

براندید؟



مهری گلچین

سوپروایزر آموزشی

مرکز تحقیقات همتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم

پزشکی تیریز

بهار ۱۳۸۷

- ترومبوسیتوپنی (کاهش پلاکت های خون)
و کم خونی (کاهش گلبول های قرمز خون) ممکن است رخ دهد.
- افزایش خفیف تا متوسط ترانس آمینازها، آلکالین فسفاتازها ، بیلیروبین یا کراتنین
- سایر عوارض جانبی:

تعداد کمی از بیماران دچار کم آبی در اثر اسهال، استفراغ و عفونت ممکن است دچار ناراحتی کلیه، کاهش فشار خون یا نارسایی قلبی کلیوی گردند. برخی عوارض جانبی ناخواسته هم ممکن است رخ دهد که نیاز نیست شما به پزشک مراجعه نمایید مگر این که مشکل آفرین گردد: ریزش مو، واکنش های پوستی حساسیتی، درد معده، پیچش های عضلانی، یبوست، التهاب محل تزریق، خستگی، التهاب مخاط دهان و درد شکم. است. در صورت بروز سایر علائم بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید.

۵. نحوه نگهداری:

تاریخ انقضا: نباید بعد از انقضای تاریخ مصرف، دارو مورد استفاده قرار گیرد.
احتیاطات خاص نگهداری: دارو دور از دسترس کودکان قرار گیرد. در دمای بالاتر از ۲۵ درجه سانتی گراد قرار داده نشود. از نور آفتاب محافظت گردد. بایستی محلول بلافاصله بعد از رقیق سازی مورد استفاده قرار گیرد.

Reference: Brochure Taxotere, Aventis.

در صورت وجود موارد زیر به پزشک اطلاع دهید:

* تهوع و استفراغ همراه با اسهال، تب همراه با اسهال و تداوم اسهال تا ۴۸ ساعت علیرغم شروع درمان ضد اسهال تجویزی
* از هیچ درمان درمان دیگری استفاده ننمایید مگر آنچه که پزشک و پرستار شما تجویز نموده اند. همچنین از سایر مایعات (قبلا بیان شده اند) استفاده ننمایید.

▪ تهوع و استفراغ:

در صورت وجود تهوع و استفراغ **بلافاصله** به پزشک اطلاع دهید.

▪ سایر علائم گوارشی:

در مواردی ممکن است علائم ناشایع انسداد روده و خونریزی دستگاه گوارش رخ دهد. افزایش گذرای آمیلاز و لیپاز (آنزیم های گوارشی) نیز ممکن است بروز نماید. سایر عوارض خفیف شامل بی اشتها، درد شکم و التهاب غشاهای مخاطی می باشد.

▪ نوتروپنی: کاهش در تعداد گلبول های سفید خون از نوع نوتروفیل (گلبول های سفید و بالاخص نوتروفیل ها در مقابله با عفونت نقش خیلی مهمی دارند)، رخ می دهد. بنابر این بایستی آزمایشات خونی بصورت منظم برای شمارش سلول های خونی انجام گیرد). وجود تب همراه با نوتروپنی نشانگر وجود عفونت است و بایستی بلافاصله درمان انجام گیرد. بلافاصله به پزشک یا پرستار خود اطلاع دهید تا درمان مناسب ضروری شروع گردد.

مقدمه: این کتابچه حاوی اطلاعات مفیدی در مورد CAMPTO است که می تواند برای شما مفید باشد. این کتابچه را همیشه دم دست داشته باشید تا در موارد لزوم به آن مراجعه نمایید.

۱. CAMPTO چیست و در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد؟

عناصر فعال در CAMPTO حاوی irinotecan hydrochloride trihydrate می باشد که به صورت ویال های تغلیظ شده ۲۰ میلی گرم / ۲ سی سی و ۸۰ میلی گرم / ۵ سی سی برای تزریق وریدی می باشد. این دارو جزء دسته ای از داروها تحت عنوان داروهای ضد سرطان می باشد.

۲. چرا CAMPTO تجویز شده است؟

معمولا این دارو برای درمان سرطان کولون یا رکتوم (روده بزرگ) مورد استفاده قرار می گیرد ولی ممکن است پزشک این دارو را به دلایل دیگری نیز تجویز نماید.

۳. مواردی که CAMPTO نبایستی استفاده گردد؟

در موارد زیر نبایستی از این دارو استفاده گردد:

- سابقه هرگونه بیماری قلبی روده ای و یا تاریخچه وجود انسداد روده
- سابقه قلبی واکنش های آلرژیک (حساسیت) شدید به این دارو

- نارسایی شدید مغز استخوان
- وجود هر گونه بیماری کبدی
- بارداری و دوران شیردهی

۴. احتیاطات خاص:

این دارو همانند سایر داروهای ضد سرطان، عوارض جانبی ناخواسته شدیدی دارد. این عوارض نیازمند توجهات خاص برای کاهش خطر عوارض ناشی از درمان می باشد. از آنجایی که معمولا این عوارض، دائمی می باشد لذا بایستی تحت نظر تیم پزشکی این دارو دریافت گردد. در صورتی که مبتلا به بیماری ارثی عدم تحمل به فروکتوز هستید، به پزشک اطلاع دهید زیرا این دارو حاوی سوربیتول بوده و برای بیمارانی که عدم تحمل به فروکتوز دارند مناسب نمی باشد.

۵. اثرات احتمالی دارو در هنگام رانندگی و کارهای عملی:

این دارو موجب بروز گیجی و یا اختلالات بینایی می گردد. در صورت وجود این علائم بایستی از رانندگی و سایر کارهای عملی اجتناب گردد.

۶. CAMPTO چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

این دارو از طریق تزریق وریدی تجویز می گردد. تزریق دارو در بیمارستان و در طی ۳۰ الی ۹۰ دقیقه صورت می گیرد. مقدار داروی دریافتی بستگی به سن، اندازه و وضعیت عمومی بدن و همچنین به سایر درمان های ضد سرطان دریافتی دارد. بسته به پروتکل درمانی، شما دارو را هر ۲ تا ۳ هفته دریافت خواهید نمود.

۷. عوارض جانبی:

این دارو همانند سایر داروهای ضد سرطان، عوارض جانبی ناخواسته ای دارد. در مورد خطرات و فواید درمان، از پزشک سوال نمایید. بایستی برخی از این عوارض جانبی ناخواسته بلافاصله درمان گردند

ممکن است در طی تزریق دارو موارد زیر رخ دهد. در صورت بروز هر کدام از آنها به پزشک مراجعه نمایید:

▪ **اسهال:** "اسهال زودرس" در کمتر از ۲۴ ساعت بعد از شروع درمان و "اسهال تاخیری" در ۲۴ ساعت بعد از تزریق دارو رخ می دهد. در صورتی که دچار اسهال شدید بایستی توصیه های زیر را بدقت دنبال نمایید:

در صورتی که در کمتر از ۲۴ ساعت اول تزریق دارو دچار اسهال شدید بلافاصله آن را با پزشک و یا پرستار مطرح نمایید. در صورت بروز اسهال زودرس، از داروهای تجویزی جهت درمان اسهال تاخیری، استفاده ننمایید. این اسهال همراه با سایر نشانه ها همانند تعریق، پیچش شکمی، آبریزش از چشم ها، اختلالات بینایی، گیجی، کاهش فشار خون، التهاب شبکیه چشم و افزایش آب دهان بروز می نماید. در صورت بروز این نشانه ها، آنها را با پزشک و یا پرستار در میان بگذارید. بعد از تزریق آتروپین، این نشانه ها برطرف می شوند. در صورت بروز اسهال در ۲۴ ساعت بعد از تزریق (اسهال تاخیری) بایستی بلافاصله داروهای ضد اسهال تجویزی دقیقا مطابق دستورات پزشک، مصرف گردد.