



آموزش بیماران آنچه نیاز دارید در مورد کاربوپلاتین بدانید؟



فریبا کاظمی اسکندانی

سرپرستار بخش خون و انکولوژی ۲

مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم
پزشکی تبریز- پاییز ۱۳۸۷

سرفه، زخم گلو و دیگر نشانه های سرماخوردگی
به پزشک اطلاع دهید. هرگز خوددرمانی
نکنید. از افراد بیمار دوری کنید. جوش های ته
سنجاقی قرمز، کوفتگی، مدفوع قیری و خون در
ادرار به پزشک اطلاع دهید. در صورت خونریزی
غیر عادی به پزشک خبر دهید و مراقب باشید تا
آسیب نبینید.

- از مصرف - آسپرین - استامینوفن - ایبوپروفن -
ناپروکسن و کتوپروفن یا هر دارویی که تب را
مخفی می کند پرهیز کنید.
- در صورت اسهال به پزشک خبر دهید و خودسرانه
درمان نکنید.
- در صورت جراحی به پزشک، دریافت کاربوپلاتین
را اطلاع دهید.
- با احتیاط مسواک بزنید. در صورت مراجعه به
دندانپزشک، مصرف دارو را اطلاع دهید.

منبع مورد استفاده:

<http://www.drugdigest.org>

پلاکت ها را کاهش دهد). خطر عفونت و خونریزی
ممکن است افزایش یابد.

- نشانه های عفونت (تب، لرز، سرفه، زخم گلو و
سوزش ادرار)
- علائم کاهش پلاکت (جوش های ته سنجاقی قرمز،
کوفتگی، مدفوع قیری و خون در ادرار) و علائم
کاهش گلبول های قرمز (خستگی و ضعف غیر
عادی، سنکوپ، سبکی سر) را گزارش کنید.
- تهوع و استفراغ

**عوارض جانبی که نیاز به توجه خاص پزشکی ندارند
فقط در صورت ادامه پزشک را مطلع کنید:**

- خستگی
- ریزش مو
- تغییر ذائقه و احساس طعم فلز
- کاهش اشتها
- درد محل تزریق

چه اقداماتی را باید حین دریافت دارو انجام دهید؟

- شما باید برای کنترل سیر بیماری و انجام منظم
آزمایشات خونی به پزشک مراجعه کنید.
- حین دریافت دارو ممکن است، توانایی بدن برای
مقابله با عفونت کاهش یابد. در صورت تب، لرز،

کاربوپلاتین: کاربوپلاتین داروی شیمی درمانی است که برای درمان انواع سرطان ها از جمله سرطان های مثانه، ریه و تخمدان استفاده می شود. کاربوپلاتین تقسیم سریع سلول های سرطانی را مهار نموده و موجب مرگ سلولی می شود. کاربوپلاتین به تنهایی یا به همراه دیگر داروهای شیمی درمانی و رادیوتراپی به کار می رود.

حین دریافت دارو چه مواردی را باید به تیم بهداشتی اطلاع دهید؟

۱. عفونت فعال
۲. بیماری دندان
۳. اختلالات خونی
۴. بیماری کلیوی
۵. رادیوتراپی اخیر
۶. مشکلات شنوایی
۷. هرگونه واکنش حساسیتی به کاربوپلاتین، داروهای شیمی درمانی و غذاها
۸. حاملگی یا تصمیم به حامله شدن و شیردهی
۹. درد یا گرفتگی عضلات دست و پا

چگونه باید این دارو را دریافت کنید؟

کاربوپلاتین به صورت انفوزیون داخل وریدی تجویز می شود. دارو در بیمارستان یا درمانگاه توسط افراد آموزش دیده و متخصص تزریق می شود. باید برنامه درمانی را به طور منظم ادامه دهید. دارو معمولاً هر ۴ هفته تکرار می شود.

هم چنین ممکن است کاربوپلاتین مستقیماً داخل شکم تزریق شود. در این پروسیجر کاربوپلاتین به داخل شکم انفوزه می شود و این عمل بیش از ۴-۲ ساعت طول می کشد. در این زمان باید شما برای اطمینان از رسیدن دارو به تومور به طور مرتب تغییر وضعیت دهید. این درمان هر ۴-۳ هفته داده می شود.

چه داروهایی با کاربوپلاتین تداخل می کنند:

- آنتی بیوتیک های خاص مانند آمفوتریسین، آمیکاسین، جنتامیسین، نتومایسین، استرپتومایسین و توبرامایسین
- داروهایی که برای درمان لخته های خونی استفاده می شود مانند کومادین
- سایر داروهای شیمی درمانی ممکن است عوارض دارو را افزایش دهند.
- واکسن ها

قبل از مصرف داروهای زیر با پزشک صحبت کنید:

- آسپرین - استامینوفن - ایبوپروفن و ناپروکسن
- در مورد داروهایی که استفاده می کنید بویژه داروهایی که خودسرانه مصرف می کنید با تیم بهداشتی صحبت کنید. چنانچه سیگاری یا الکلی هستید و یا کافئین زیاد مصرف می کنید به تیم بهداشتی اطلاع دهید. این داروها ممکن است در

عملکرد دارو اثر کنند. قبل از شروع یا قطع آنها با پزشک مشورت کنید.

عوارض جانبی که باید حین دریافت کاربوپلاتین به آن توجه کنید؟

عوارض جانبی ناشی از کاربوپلاتین بستگی به دوز دارو، روش تزریق و رادیوتراپی و بیماری زمینه ای دارد. عوارض زیر در تمام بیماران بروز نمی کند.

عوارضی که باید در صورت بروز هر چه سریعتر به

پزشک اطلاع دهید عبارتند از:

عوارض نادر:

- تغییر در میدان بینایی
- اختلال تنفسی و خس خس سینه
- کاهش شنوایی
- زنگ زدن گوش ها
- کاهش یا افزایش مقدار ادرار
- درد و سوزش ادرار
- گز گز و کرختی در انگشتان دست و پا
- کهیر و خارش

عوارض شایع:

- کاهش سلول های خونی (کاربوپلاتین ممکن است تعداد گلبول های سفید، گلبول های قرمز و