



## آموزش بیماران آنچه نیاز دارید در مورد داکاربازین بدانید؟



مهری گلچین

سوپروایزر آموزشی

مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم

پزشکی تهریز

تایستان ۱۳۸۷

بروز عفونت می گردد. از ایجاد بریدگی و خراش خودداری نمایید. ممکن است در اعمال دندانپزشکی و نیز مراقبت های روزانه دندان مشکلاتی ایجاد گردد. در هنگام مسواک زدن دندان ها و استفاده از نخ دندان از ایجاد صدمه به دندان ها و لثه ها خودداری نمایید.

منبع مورد استفاده:

<http://www.drugdigest.org>

## ۶. هنگام دریافت داکاربازین چه

### مواردی را بایستی کنترل نمایم؟

✓ بصورت منظم و دوره ای به پزشک برای بررسی پیشرفت بهبودی بیماری مراجعه نمایید. بایستی آزمایشات منظم خون انجام دهید. عوارض جانبی داکاربازین ممکن است بعد از قطع درمان ادامه داشته باشد. بلافاصله عوارض را گزارش نمایید.

✓ در هنگام دریافت دارو ممکن است حال عمومی بیمار خوب نباشد. این غیر منتظره نیست زیرا داکاربازین سلول های سالم را نیز همانند سلول های سرطانی متاثر می کند. بروز هر کدام از عوارض جانبی فوق را اطلاع داده ولی دوره درمانی دریافت دارو را ادامه دهید، مگر اینکه پزشک مصرف آن را قطع نماید.

✓ در حین دریافت دارو استعداد بروز عفونت بیشتر می گردد. لذا بیماران بایستی از تماس با افراد دچار سرمازدگی، آنفلونزا و برونشیت خودداری نمایند.

✓ در صورت نیاز به دریافت واکسن آن را به کادر درمانی و یا پزشک اطلاع دهید و از تماس با افرادی که اخیرا واکسن فلج اطفال خوراکی دریافت نموده اند خودداری نمایید.

✓ داکاربازین ممکن است مشکلات خونی ایجاد نماید. این امر موجب تاخیر در بهبودی بیماران و

**مقدمه:** این پمفلت حاوی اطلاعات مفیدی در مورد داکاربازین است که می تواند برای شما مفید باشد. این پمفلت را همیشه دم دست داشته باشید تا در موارد لزوم به آن مراجعه نمایید.

## ۱. داکاربازین چیست؟

نام دیگر آن انکووین می باشد. نوعی شیمی درمانی سرطان هست که برای درمان سرطان بکار می رود. این دارو با رشد سلول های با سرعت رشد بالا همانند سلول های سرطانی ممانعت می نماید. این دارو معمولا برای درمان سرطان پوست بکار می رود. این دارو هم چنین همراه با سایر داروهای ضد سرطان برای درمان سرطان های خون (بیماری هوجکین) بکار می رود.

## ۲. قبل از استفاده از داکاربازین باید چه

### چیزهایی را مد نظر قرار دهید؟

وجود هر کدام از موارد زیر را اطلاع دهید:

- عفونت ( خصوصاً عفونت های ویروسی مانند آبله مرغان و هرپس )
- سابقه قبلی واکنش های آلرژیک (حساسیت) به این دارو و یا سایر داروهای شیمی درمانی، سایر داروها ، غذاها و...
- اختلالات خونی
- بیماری های دندان
- سابقه رادیوتراپی اخیر

- بارداری و دوران شیردهی

## ۳. داکاربازین چگونه تجویز می گردد؟

این دارو توسط پرسنل آموزش دیده و در بیمارستان و یا مطب پزشکان بصورت تزریق داخل وریدی مورد استفاده قرار می گیرد. دوزهای دارویی تجویز شده بایستی بصورت منظم دریافت گردند. دوز روزانه برای چندین روز داده شده و هر ۴ هفته یا هر ۱۵ روز یک یکبار ، تکرار می گردد. در طی دریافت دارو، دریافت داروهای ضد سرطان نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

## ۴. تداخلات دارویی

IL-2

لوودوپا

واکسن های ویروسی زنده

فتی توئین

مصرف سایر داروها مانند داروهای بدون نسخه پزشک، مکمل های تغذیه ای و یا سایر فرآورده های گیاهی را به پزشک یا کادر درمانی اطلاع دهید. مصرف زیاد کافئین یا الکل، سیگار و سایر داروهای غیر مجاز را اطلاع دهید. این داروها ممکن است عملکرد داکاربازین را مختل نمایند. مصرف و یا قطع مصرف هر کدام از داروها را اطلاع دهید.

## ۵. عوارض جانبی :

عوارض جانبی که بایستی به پزشک یا پرسنل درمانی

بلافاصله گزارش نمایید:

- ❖ سوزش محل تزریق دارو
- ❖ ادرار برنگ قهوه ای یا زرد تیره
- ❖ سرگیجه و احساس سبکی سر
- ❖ دفع ادرار دردناک
- ❖ تورم، درد، قرمزی یا التهاب محل تزریق
- ❖ تب یا لرز، زخم گلو
- ❖ درد عضلات
- ❖ خونریزی یا کبودی غیر عادی، لکه های قرمز پوستی
- ❖ خستگی و یا ضعف غیر عادی
- ❖ استفراغ
- ❖ زردی چشم ها یا پوست

عوارض جانبی که معمولا نیازمند توجهات پزشکی

نیستند:

- ( در صورت تداوم عوارض و یا ایجاد ناراحتی به پزشک و یا کادر درمانی مراجعه نمایید)
- ❖ افزایش حساسیت پوستی به نور خورشید یا اشعه ماورا بنفش
- ❖ کاهش اشتها
- ❖ تهوع
- ❖ زخم دهان